

## Diversidad de peces en la cuenca del Alto Yuruá (Ucayali, Perú)

### Diversity of fishes in the Alto Yuruá Basin (Ucayali, Perú)

Blanca Rengifo

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Museo Historia Natural, Departamento de Ictiología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Apartado 140434, Lima 14, Perú.  
Email Blanca Rengifo:  
[blanca.rengifo@gmail.com](mailto:blanca.rengifo@gmail.com)

#### Resumen

El presente estudio compara los patrones de diversidad de peces en la Cuenca del Alto Yurúa. El área de estudio comprendió tres sub cuencas: Beu, Breu y Yurúa, todas sin impacto antropogénico. Mediante pesca con redes de arrastre a orilla, se colectaron 10564 individuos y se identificaron 185 especies de peces. En escala regional, el promedio del índice de diversidad Shannon ( $H'$ ) para Beu fue de 2,02; para Breu 1,84 y para Yurúa 1,75. Según el análisis de rarefacción, Yurúa tuvo la riqueza de especies esperada más alta (91 spp.) en comparación con Beu (87) y Breu (68). En la escala local, los ambientes lóticos presentaron mayor riqueza y diversidad que los lénticos. La diversidad promedio ( $H'$ ) fue mayor en lóticos (Beu 2,04; Breu 1,90; y Yurúa 1,86), comparados con lénticos de los mismos (Beu 1,66; Breu 1,86; y Yurúa 1,82). La mayor diversidad de peces observada en ambiente lóticos podría explicarse por que la mayoría de peces amazónicos tienen el comportamiento de desplazarse por los canales principales de los ríos, mientras que los lagos pueden presentar condiciones de estrés estacional (alta presión de depredación y bajas concentraciones de oxígeno disuelto).

**Palabras claves:** Biodiversidad, peces amazónicos, Alto Yurúa, Ucayali, Perú

#### Abstract

The present study compares the patterns of fish's diversity of the Alto Yurúa Basin. The study area included three sub basins: Beu, Breu and Yurúa, all without anthropogenic impact. Fishing was carried out with trawls, 10564 individuals were collected and 185 fish's species were identified. In regional scale, the average of the Shannon diversity index ( $H'$ ) for Beu was of 2,02; for Breu 1,84 and Yurúa 1,75. The rarefaction analysis shows to Yurúa with the highest species richness (91 spp.), in comparison with Beu (87) and Breu (68). In the local scale, the diversity average ( $H'$ ) was highest in lotic environments (Beu 2,04; Breu 1,90; and Yurúa 1,86), compared with respective lentic environments (Beu 1,66; Breu 1,86; and Yurúa 1,82). The highest diversity of fishes observed in lotic environments could be explained because the most of Amazonian fishes have the behavior to travel by the main channels of the rivers, while the lakes can have stress seasonal conditions (high depredation pressure and low concentrations of dissolved oxygen).

**Keywords:** Biodiversity, Amazonian fishes, Alto Yurúa, Ucayali, Peru.

#### Introducción

El río Yurúa nace en el Perú pero su mayor recorrido lo realiza en territorio Brasileño, donde cambia de nombre por Jurúa y se une al río Amazonas. El tramo que corresponde al Perú se denomina Alto Yurúa y esta formado por varios afluentes entre los que se encuentran el río Breu y el Beu. Toda esta cuenca no se encuentra afectada por impacto antrópico, por lo que ofrece una buena posibilidad de estudiar las comunidades de peces en los ríos Amazónicos prístinos del llano inundado (Ward y Tockner 2001).

Antecedentes de estudios de las comunidades de peces en el río Yurúa han sido realizados en el tramo brasileño del Yurúa por La Monte (1935) registrando 37 especies; posteriormente Silvano & Oyakawa (2000) realizaron un estudio de los patrones temporales y espaciales de diversidad en la cuenca del Alto Yurúa. Silvano et al. (2001) realizaron una evaluación de la ictiofauna en el Alto Yurúa registrando 115 especies de peces. Por otro lado Domingues do Amaral (2003) realizó estudios de etnoecología relacionando la diversidad y la pesquería de autoconsumo realizada por las comunidades nativas en la cuenca del Río Breu, subcuenca fronteriza entre Perú y Brasil.

El principal objetivo de este estudio fue determinar la diversidad de especies de peces en tres subcuencas del Alto Yurúa, comparando la diversidad de especies de peces entre ellas y entre ambientes lóticos y léticos.

#### Materiales y métodos


##### Localidades de estudio

El estudio se llevo a cabo en tres sub-cuencas en un total de 32 estaciones, distribuidas en 9 en el Río Beu, 17 en el Río Breu y 6 en el Río Alto Yurúa (Fig. 1).

En cada estación se registró la siguiente información: coordenadas geográficas (UTM / WGS 84), altitud (m), descripción física del hábitat (Allan 1995), y medición de parámetros fisicoquímicos in situ utilizando un equipo multiparámetros Hanna: concentración de oxígeno disuelto, pH, concentración de Dióxido de carbono, Sólidos totales disueltos (TSD), Conductividad y Temperatura.

##### Muestreo

El estudio se llevó a cabo en el periodo de vacante, entre el 10 y 29 de julio del 2005. Los peces se colectaron con dos redes monofilamento de arrastre a la orilla (4,9 x 1,5 m; malla 15 mm y de 9,6 x 2 m; malla 24 mm). El material colectado fue fijado en una solución de formol 10% y después de 48 h, conservado en etanol 70%. La identificación preliminar se realizó utilizando información de cuencas vecinas (Purús, Madre de Dios) y la experiencia previa en diversas cuencas de la Amazonía. Para su traslado, el material fue rotulado, envuelto en gasa humedecida y en



**Figura 1.** Área de estudio. Se indican las diferentes estaciones a lo largo de los ríos Yuruá, Beu y Breu.

bolsas plásticas. El material biológico obtenido fue separado, identificado (Apéndice 1), catalogado y depositado en la Colección Ictiologica del Museo de Historia Natural (MUSM).

**Tabla 1.** Caracterización de las estaciones muestreadas en las Subcuenca evaluadas. Cuenca del Alto Yurúa.

Sub Cuenca	Río Beu	Río Breu	Río Yurúa
Estaciones	9 (E1-E7, E15, E28)	17 (E8-E14, E16-E25)	6 (E26, E27, E29-E32)
Cuerpo de Agua	E1-E4, E6, E7, E15, E28	Lótico E8-E10, E12-E14, E16, E17, E19, E25	E26, E27, E29-E31
Altitud (m)	E5 224 - 282	Lótico E9, E11, E18 214 - 340	E32 204 - 296
Velocidad de corriente	lenta a moderada	nula, lenta-moderada	nula, lenta-moderada
Ancho del cauce (m)	1- 25	4 - 50	15 - 50
Profundidad promedio (m)	0,4 - 0,8	0,2 - 1,8	0,5 - 1,5
Transparencia (m)	0,1 - Total	0,4 - Total	0 - 0,3
Hábitat	Playas arenosas, pozas con palizada y hojarasca, cachuelas y laguna meandrífica	Cachuela, Tahuampa, pozas y playas arenosas.	Cachuela, resaca, playa arenosa y laguna meandrífica
Área de muestreo (m <sup>2</sup> )	6075	13950	4050
Substrato	Predominancia de fondos arenolimoso y roca sedimentaria.	Predominancia de limo y arena	Predominancia arenolimoso
Línea de orilla (amplitud, cobertura, pendiente)	Estrechas-amplias, Predominantemente desprotegidas, 0- 30°	Estrechas - amplias, semiprotegidas a protegidas, 0 - 80°	Amplias, desprotegidas, 0 - 70°
Vegetación circundante	Predomina bosque de ribera	Pacal y Bosque de ribera	Bosque de ribera
Tipo de Agua	Dominancia aguas blancas (6)	Blancas (9), claras (6) y negras (2)	Blancas (5), negra (1)
Color aparente del Agua	Verde / marrón	Incoloro/verde/marrón	verde/té oscuro
Temperatura del aire (°C)	21,0 - 34,0	19,8 - 33,1	33,4 - 33,9
Temperatura del agua (°C)	19,9 - 31,9	21,2 - 33,8	28,5 - 29,8
pH	6,30 - 8,55	7,21 - 8,75	8,45 - 8,67
Oxígeno disuelto (ppm)	5,2 - 8,55	3,0 - 8,3	6,4 - 7,4
Dioxido de Carbono (ppm)	10 - 100	18,0 - 69,0	24,0 - 3,0
Sólidos Disueltos Totales (ppm)	95 - 478	105 - 303	247 - 281
Conductividad (μS)	217 - 568	215 - 597	497 - 526

**Tabla 2.** Resumen de la composición taxonómica de la ictiofauna colectada en la Cuenca del Alto Yurúa.

Ordenes	Familias	Géneros	Especies	individuos
Atheriniformes	1	1	1	14
Characiformes	10	48	78	9544
Clupeiformes	1	1	1	6
Gymnotiformes	2	2	2	8
Myliobatiformes	1	1	1	1
Perciformes	2	7	10	215
Pleuronectiformes	1	1	1	3
Siluriformes	7	32	45	772
Synbranchiformes	1	1	1	1
	26	94	140	10564

### Entrevistas

Realizamos entrevistas a los guías locales de las etnias Amahuaca, Yaminahua y Ashanika, para determinar las especies de consumo, y la situación de la pesca en la zona.

### Análisis de los datos

Con los resultados obtenidos se comparó la diversidad encontrada en cada subcuenca (escala regional) y la diversidad observada en cada una de las dos principales categorías de hábitat dentro de cada subcuenca (escala local): lagunas (ambientes lóticos) y ríos (ambientes lóticos), abarcando el cauce principal (márgenes, playas) y quebradas.

**Tabla 3.** Riqueza (S), Abundancia (N) y Diversidad por Localidades en la cuenca del Alto Yurúa.

Localidades	Río Beu	Río Breu	Río Jurúa
<b>S total</b>	92	97	68
%S	65,71	69,29	48,57
<b>N total</b>	3249	4674	2641
%N	30,76	44,24	25,00
<b>H' promedio</b>	2,02	1,84	1,75
<b>Desviación estandar (H')</b>	0,57	0,50	0,30

Se evaluó la diversidad promedio de peces usando el Índice de Shannon-Weaver ( $H'$ ). Para explicar las diferencias de los esfuerzos de muestreo así como en el número de peces colectados, se comparó la diversidad entre subcuenca usando curvas de rarefacción para la riqueza de especies. Este método permite comparar la riqueza de especies entre muestras de diferente tamaño, así como estimar la riqueza de especies que podría ser obtenida en un esfuerzo de muestreo dado (Magurran, 1988).

## Resultados

### Descripción de las localidades de estudio

Las estaciones evaluadas, en los cuerpos de agua de la Cuenca del Alto Yurúa, presentaron características típicas de hábitats de selva baja, con aguas generalmente de tipo blancas (18 estaciones) y en menor proporción aguas claras (7) y negras (5) o una combinación de ambas (2). Las aguas blancas acarrean mayor cantidad de sedimentos y son usualmente muy productivas. Los ríos de aguas claras y negras, por otro lado, tienen menor cantidad de sedimentos y materia orgánica, pero también presentan mayor acidez, por lo que la producción primaria acuática es baja (Sioli, 1985; Lowe – McConnell, 1987). La Cuenca del Río Yurúa se encuentra dentro de la definición de ríos de llano inundado (Junk et al., 1989) con muchos tributarios y grandes lagunas de llano inundado, donde el nivel del agua varía considerablemente (aproximadamente 10 m) entre creciente y vaciante.

Los ambientes evaluados fueron principalmente lóticos (9 quebradas y 3 ríos), además de ambientes lénicos (5 lagunas fluviales), los cuales presentaron distintos hábitat. La caracterización de las estaciones de estudio se aprecia en la Tabla 1.

**Tabla 4.** Riqueza total(S), Abundancia total(N) y Diversidad promedio( $H'$ ) por hábitat en la cuenca del Alto Yurúa.

Hábitat	Lénico		
	Beu	Breu	Jurúa
<b>S total</b>	15	49	8
% S	10,71	35,00	5,71
<b>N total</b>	291	1691	47
% N	2,75	16,01	0,44
<b>H' promedio</b>	1,82	1,66	1,82
<b>Desviación estandar (H')</b>	0	0,74	0
Hábitat	Lóticos		
	Beu	Breu	Jurúa
<b>S total</b>	87	85	61
% S	62,14	60,71	43,57
<b>N total</b>	2958	2984	2594
% N	28,00	28,24	24,55
<b>H' promedio</b>	2,04	1,90	1,86
<b>Desviación estandar (H')</b>	0,60	0,46	0,37

**Tabla 5.** Riqueza (S) y Abundancia (N) por órdenes en la cuenca del Alto Yurúa.

Orden	S	% S	N	% N
Atheriniformes	1	0,71	14	0,13
Characiformes	78	55,71	9544	90,34
Clupeiformes	1	0,71	6	0,06
Gymnotiformes	2	1,43	8	0,08
Myliobatiformes	1	0,71	1	0,01
Perciformes	10	7,14	215	2,04
Pleuronectiformes	1	0,71	3	0,03
Siluriformes	45	32,14	772	7,31
Synbranchiformes	1	0,71	1	0,01
<b>Total</b>	<b>140</b>	<b>100</b>	<b>10564</b>	<b>100</b>


### Diversidad, Riqueza y Abundancia de las localidades de estudio.

Se colectaron 10564 peces, identificándose 140 especies agrupadas en 94 géneros, 20 familias y 9 órdenes (Tabla 2). Del total, fueron colectados 3249 individuos (92 especies) en río Beu, 4674 (97 especies) en río Breu y 2641 (68 especies) en río Yurúa (Tabla 3).

En la escala regional, las subcuenca del río Beu mostró una la mayor diversidad promedio ( $H' = 2,02$ ), mientras que las subcuenca de los ríos Breu y Yurúa mostraron una diversidad moderada ( $H' = 1,84$  y  $H' = 1,75$  respectivamente). (Tabla 3). De acuerdo al análisis de rarefacción, al comparar el número estimado de especies colectadas con el tamaño de la muestra más pequeña (2641 individuos), el río Yurúa obtuvo la riqueza de especies (S) más alta (90), comparada a la riqueza en Beu (87) y Breu (68) (Figura 2).

En la escala local, se observa que los ambientes lóticos presentan la mayor riqueza de especies de peces y la mayor diversidad promedio que los ambientes lénicos estudiados. (Tabla 4).

El grupo de peces con mayor Riqueza (S) en la cuenca del Alto Yurúa corresponde al orden Characiformes (peces con escamas) que representa el 55,71% (78 spp.) del total. En segundo lugar, el orden Siluriformes (bagres con cuerpo desnudo o cubierto por placas) presentan el 32,14% (45 especies agrupadas en 10 familias) del total de especies. El orden Perciformes (peces con espinas en las aletas) presenta 10 especies (7,14% del total), donde 9 especies pertenecen a la familia Cichlidae (6,43%). Los órdenes Atheriniformes (peces aguja), Clupeiformes (anchovetas), Myliobatiformes (rayas), Pleuronectiformes (lenguados) y Synbranchiformes (peces relictos), con una especie cada uno, representan en conjunto el 3,55% de la riqueza (Tablas 5 y 6).

**Figura 2.** Curva de Rarefacción de especies por Subcuenca en la cuenca del Alto Yurúa.


**Tabla 6.** Riqueza (S) y Abundancia (N) por familias (en el Alto Yurúa).

Familia	S	% S	N	% N
Achiridae	1	0,71	3	0,03
Anostomidae	2	1,43	15	0,14
Apterodontidae	1	0,71	2	0,02
Aspredinidae	1	0,71	1	0,01
Belonidae	1	0,71	14	0,13
Callichthyidae	3	2,14	18	0,17
Characidae	59	42,14	9040	85,57
Cichlidae	9	6,43	213	2,02
Crenuchidae	4	2,86	68	0,64
Curimatidae	5	3,57	150	1,42
Cynodontidae	1	0,71	1	0,01
Engraulidae	1	0,71	6	0,06
Erythrinidae	2	1,43	38	0,36
Gasteropelecidae	2	1,43	193	1,83
Gymnotidae	1	0,71	6	0,06
Heptapteridae	8	5,71	81	0,77
Lebiasinidae	1	0,71	12	0,11
Loricariidae	21	15,00	543	5,14
Parodontidae	1	0,71	25	0,24
Pimelodidae	9	6,43	100	0,95
Potamotrygonidae	1	0,71	2	0,02
Prochilodontidae	1	0,71	2	0,02
Pseudopimelodidae	1	0,71	14	0,13
Sciaenidae	1	0,71	2	0,02
Synbranchidae	1	0,71	1	0,01
Trichomycteridae	2	1,43	15	0,14
<b>Total</b>	<b>140</b>	<b>100</b>	<b>10564</b>	<b>100</b>

El orden Characiformes obtuvo la mayor abundancia de peces con un 82,54% (1366 individuos), debido principalmente al dominio de la familia Characidae (1231 individuos, 74,38% del total). Los Siluriformes, en segundo lugar (161 individuos, 9,73%) y casi la mitad pertenecen a la familia Loricariidae (96 individuos) (Tablas 5 y 6).

## Entrevistas

De las entrevistas a pobladores locales, se determinaron 45 especies de consumo (Apéndice 1), de las cuales las más importantes son: «saltón» (*Brachyplatystoma filamentosum*), «zúngaro» (*Zungaro zungaro*), «dorado» (*Brachyplatystoma flavicans*), «donceilla» (*Pseudoplatystoma fasciatum*), «pejetorre» (*Phractocephalus hemiliopterus*), «gamitana» (*Colossoma macropomum*), y «pacó» (*Piaractus brachypomus*). Otras especies también importantes son «boquichico» (*Prochilodus nigricans*), «yahuarachi» (*Potamorhina altamazonica*), «piraña» (*Serrasalmus rhombeus*), «cunshi» (*Pimelodus* sp.), «sábalos» (*Brycon melanopterus*, *Salminus affinis*), «sardina» (*Triportheus angulatus*), «lisas» (*Leporinus* sp., *Schizodon* sp.), «palometas» (*Mylossoma duriventre*).

**Figura 3.** Curva de acumulación de especies según estación de muestreo en la cuenca del Alto Yurúa.

## Discusión

La riqueza de especies registradas en este estudio para el Alto Yurúa fue de 185 especies, 140 colectadas y 45 de consumo obtenidas de entrevistas locales y observaciones. Este valor fue mayor al registrado previamente para la ictiofauna de la parte brasileria (115 especies; Silvano & Oyakawa, 2001). Tal diferencia puede atribuirse, en parte, a la extensión y esfuerzo de muestreo de la presente evaluación.

La riqueza de especies colectadas (140), de acuerdo a los resultados de la curva de especies por área acumulada (modelo logístico) podría verse incrementada con una mayor área de muestreo, hasta un total de 162 especies esperadas a ser colectadas con el método de pesca utilizado (arrastre a orilla) (Figura 3). Por lo que la riqueza total esperada a ser registrada en el área evaluada sería de 207 especies, incluyendo las 45 especies de consumo registradas mediante las encuestas a los pobladores.

Las aguas blancas, en la mayoría de los ambientes acuáticos estudiados, se caracterizan por presentar una alta cantidad de nutrientes, lo cual les da la característica de ser muy productivas, albergando una gran abundancia de peces en comparación con los otros tipos de agua (Sioli, 1985; Lowe-McConnell, 1987), lo cual justificaría la alta abundancia de individuos encontrados en la Cuenca del Alto Yurúa.

La dominancia por los Characiformes (peces de escamas) y Siluriformes (peces de cuero) podría explicarse por que los Characidae forman grandes cardúmenes y habitan un mismo tipo de ambiente, lo que causaría su mayor abundancia en las capturas. Los Perciformes presentaron también importantes especies de consumo («bujurquis»).

Las diferencias entre los valores diversidad entre las tres subcuencas evaluadas puede explicarse, en parte, por la extensión del muestreo, ya que en el río Breu se realizaron más estaciones de muestreo, abarcando más área, que en los ríos Beu y Yurúa.

De acuerdo a los resultados los cuerpos de agua lóticos presentaron mayor diversidad que los cuerpos de agua léticos. Este patrón puede estar relacionado a dos factores principales: primero, la mayoría de los peces amazónicos se mueven a lo largo de los ríos, que sirven como una ruta de migración entre el río, los lagos y el bosque inundado. Estos movimientos pueden aumentar la diversidad de los peces en el canal del río, ya que estos lugares reciben las especies de peces que vienen de distintos hábitats. Además, los ríos generalmente están conectados con otros hábitats en comparación con las lagunas (aislados del río principal), y el grado de conectividad en el hábitat acuático incrementa la riqueza de especies (Henderson & Robertson, 1999; Rathert et al., 1999; Ward & Tockner 2001). En segundo lugar, las lagunas del llano inundado pueden presentar condiciones ecológicas de estrés estacionales, tales como una alta presión de depredación y baja concentración de oxígeno disuelto durante la estación seca (Junk et al., 1983; Lowe-McConnell 1987). Algunas especies de peces no pueden hacer frente a tales condiciones, lo que reduciría la riqueza como ocurre en los lagos amazónicos (Silvano et al., 2002).

## Agradecimientos

Esta investigación fue auspiciada por el Programa de Bosques, desarrollado por World Wildlife Fund Perú (WWF – OP) dentro del marco de la propuesta de categorización de la Reserva Comunal Yurúa y contó con el apoyo de los pobladores de las comunidades nativas Santa Rosa, San Pablo y Dulce Gloria en el trabajo de campo

## Literatura citada

- Allan, D. 1995. Stream Ecology, structure and function of running waters. Chapman and Hall, 2-6 Boundary Row, London. 388 pp.
- Domingues do Amaral, B. 2003. Fishing territoriality and diversity between the ethnic populations Ashaninka and Kaxinawá, Breu river, Brazil/Peru. En: Etnoecología.
- Henderson P.A. & Robertson B.A. 1999. On structural complexity and fish diversity in the Amazonian floodplain. In: C. Padoch, Ayres J.M., Pinedo-Vasquez M. & Henderson A. (eds.) Várzea - diversity, development and conservation of Amazonia's whitewater floodplains. New York Botanical Garden, NY, pp. 45-58.
- Junk W.J., Bayley P.B. & Sparks R.E. 1989. The flood pulse concept in river-floodplain systems. In: D.P. Dodge (ed.) Proceedings International Large River Symposium, Canadian Special Publications in Fisheries and Aquatic Sciences 106, pp. 110-127.
- Junk W.J., Soares M.G.M. & Carvalho F.M. 1983. Distribution of fish species in a lake of the Amazon River floodplain near Manaus (Lago Camaleão), with special reference to extreme oxygen conditions. Amazoniana 7, 397-431.
- La Monte, F. R. 1935. Fishes from rio Jurua and Rio Purus, Brazilian Amazonas. American Museum Novitates, 784: 1 – 8.
- Lowe-McConnell, R.H. 1987. Ecological Studies in Tropical Fish Communities. Cambridge University Press. Cambridge, New York.
- Magurran, A.E. 1988. Ecological diversity and its measurement. Princeton University Press, Princeton.
- Rathert D., White D., Sifneos J.C. & Hughes R.M. 1999. Environmental correlates of species richness for native freshwater fish in Oregon, USA. Journal of Biogeography 26, 257-273.
- Silvano, R. A. M., Oyakawa, O.T. 2000. Spatial and temporal patterns of diversity and distribution of the Upper Jurúa river fish community (Brazilian Amazon). Environmental Biology of Fishes 57, 25 – 35.
- Silvano, R. A. M., Oyakawa, O.T., Amaral, B.D. & Begosi, A. 2001. Peixes do Alto Rio Jurúa (Amazonia, Brasil). Editora de USP, São Paulo.
- Sioli, H. 1985. The Amazon and its main affluents: Hydrography, morphology of the river courses, and river types. In: Sioli (ed.) The Amazon: limnology and landscape ecology of a mighty tropical river and its basin. Dr. W. Junk Publishers, Dordrecht, Boston, Lancaster, pp. 127 – 165.
- Ward J.V. & Tockner K. 2001. Biodiversity: towards a unifying theme for river ecology. Freshwater Biology 46, 807-819.

**Apéndice 1.** Lista Taxonómica de las especies registradas (colectadas y observadas), nombres comunes y en lengua nativa (Ama= Amahuaca, Yami= Yaminahua, Asha= Ashanika) y usos potenciales (A = Autoconsumo, C = Consumo Comercial, O = Ornamental) en la Cuenca del Alto Yuruá.

Taxas	Nombre común	Nombres en lengua nativa	Usos			
	Ama	Yami	Asha	A	C	O
Beloniformes						
Belontidae						
<i>Pseudotylosurus angusticeps</i> (Günther, 1866)	pez aguja	mustumvisha	onkonashi	x	x	
Characiformes						
Anostomidae						
<i>Leporillus vittatus</i> (Valenciennes, 1850) (*)	lisa	vathon	seo fero	tzirotsi	x	x
<i>Leporinus friedericci</i> (Bloch, 1794)	lisa	vathon	fato	momo	x	x
<i>Leporinus striatus</i> (Kner, 1858) (*)	lisa	vathon	fato	momo	x	x
<i>Leporinus trifasciatus</i> (Steindachner, 1876)	lisa	vathon	fato	momo	x	x
<i>Schizodon fasciatus</i> (Spix & Agassiz, 1829)	lisa	moxo vaton		covana	x	x
Characidae						
<i>Astrocephalus boelklei</i> (Menezes, 1977)	pejeperro	xuto	xuto		x	
<i>Aestrorhynchus sp.</i> (*)	pejezorro	xuto	xuto	thakiri	x	
<i>Aphyocharax albturnus</i> (Günther, 1869)	sardina	zanin	tene chio		x	
<i>Aphyocharax pusillus</i> Günther, 1868	sardina	zanin	tene chio		x	
<i>Astyanax bimaculatus</i> (Linnaeus, 1758)	sardina	yapa	yapa reto	mereto	x	x
<i>Astyanax sp.</i>	sardina	yapa	yapa reto	mereto	x	x
<i>Brachychalcinus sp.</i>	sardina	yapa	yapa reto		x	
<i>Brycon melanopterus</i> (Cope, 1872) (*)	sábalo cola negra	xaxuntzatza	yapa reto	mamori	x	x
<i>Bryconamericus sp.1</i>	mojarra	yapa	yapa reto		x	
<i>Bryconamericus sp.2</i>	mojarra	yapa	yapa reto		x	
<i>Ceratobranchia sp.</i>	mojarra	yapa	yapa reto		x	
<i>Characidae 1</i>	mojarra	yapa	yapa reto		x	
<i>Characidae 2</i>	mojarra	yapa	yapa reto		x	
<i>Charax caudimaculatus</i> Lucena, 1987	mojarra	yapa	yapa reto		x	
<i>Charax tectifer</i> (Cope, 1870)	mojarra	xuto	yapa reto		x	
<i>Cheirodon luelingi</i> Géry, 1964	mojarra	yapa	yapa reto		x	
<i>Cheirodon sp.</i>	mojarra	yapa	yapa reto		x	
<i>Chrysobrycon sp.</i>	mojarra	yapa	yapa reto		x	
<i>Clupeorarax anchovaeoides</i> Pearson, 1924	anchoveta	yapa	yapa reto		x	
<i>Colossoma macropomum</i> (Cuvier, 1816)	gamitana	yapa	asapa	covananiroki	x	x
<i>Creagrutus peruanus</i> (Steindachner, 1875)	mojarra	yapa	yapa reto	covananiroki	x	
<i>Creagrutus sp.</i>	mojarra	yapa	yapa reto	covananiroki	x	
<i>Ctenobrycon hauwellianus</i> (Cope, 1870)	mojarra	vuronchon	yapa reto		x	
<i>Ctenobrycon spirilus</i> (Cope, 1870)	mojarra	vuronchon	yapa reto		x	
<i>Cynopotamus amazonus</i> (Günther, 1868) (*)	dentón		yapa reto		x	
<i>Engraulisoma taeniatum</i> Castro, 1981	anchoveta		yapa reto		x	
<i>Galeocharax gulo</i> (Cope, 1870)	mojarra	yapa	yapa reto	matzitaki	x	
<i>Gephyrocharax sp.</i>	mojarra	yapa	yapa reto	shocuarreki	x	
<i>Gymnorimbus sp.</i>	mojarra	yapa	yapa reto		x	
<i>Hemibrycon jabonero</i> Schultz, 1944	mojarra	yapa	yapa reto		x	
<i>Hypessobrycon sp.</i>	mojarra	yapa	yapa reto		x	
<i>Knodus aff. septentrionalis</i>	mojarra	yapa	yapa reto		x	
<i>Knodus beta</i> Henn & Wilson, 1914	mojarra	yapa	yapa reto		x	
<i>Knodus breviceps</i> (Eigenmann, 1908)	mojarra	yapa	yapa reto		x	
<i>Knodus moenkhausii</i> (Eigenmann & Kennedy, 1903)	mojarra	yapa	yapa reto		x	

(continúa...)

**Apéndice 1.** continuación

Taxas	Nombre común	Nombres en lengua nativa Ama Yami	Asha	Usos A C O
<i>Knodus sp.</i>	mojarra	yapa	yapa reto	x
<i>Leptagoniates steindachneri</i> Boulenger, 1887	pez vidrio			x
<i>Moenkhausia aff. comma</i>	mojarra	yapa	yapa reto	x
<i>Moenkhausia chrysargyrea</i> (Günther, 1864)	mojarra	yapa	yapa reto	x
<i>Moenkhausia dichroura</i> (Kner, 1858)	mojarra	yapa	yapa reto	x
<i>Moenkhausia intermedia</i> Eigenmann, 1908	mojarra	yapa	yapa reto	x
<i>Moenkhausia lepidura</i> (Kner, 1858)	mojarra	yapa	yapa reto	x
<i>Moenkhausia oligolepis</i> (Günther, 1864)	mojarra	yapa	yapa reto	x
<i>Moenkhausia sp.</i>	mojarra	yapa	yapa reto	x
<i>Mylossoma duriventre</i> (Cuvier, 1818)	palometa		make	enomenta x x x
<i>Odontostilbe fugitiva</i> Cope, 1870	mojarra	yapa	yapa reto	x
<i>Odontostilbe sp. 2 (alto)</i>	mojarra	yapa	yapa reto	x
<i>Odontostilbe sp.1(largo)</i>	mojarra	yapa	yapa reto	x
<i>Paragoniates alburnus</i> Steindachner, 1876	mojarra	yapa	yapa reto	x
<i>Parecbasis sp.</i>	mojarra	yapa	yapa reto	x
<i>Phenacogaster aff. megalosticus</i>	mojarra	yapa	yapa reto	x
<i>Phenacogaster megalostictus</i> Eigenmann, 1909	mojarra	yapa	yapa reto	x
<i>Phenacogaster sp.</i>	mojarra	yapa	yapa reto	x
<i>Piaractus brachypomus</i> (Cuvier, 1818) (*)	paco		asapa	coamyiri x x x
<i>Prionobrama filigera</i> (Cope, 1870)	sardina	yapa	yapa	x
<i>Pygocentrus nattereri</i> Kner, 1858 (*)	piraña roja		make oshi	joma x x x
<i>Roebooides sp.</i>	sardina		yapa pasi	thakiri x
<i>Salminus affinis</i> Steindachner, 1880 (*)	sábalo	ypantha	sani	mamori x x x
<i>Scopaechorax sp.</i>	sardina	yapa	yapa reto	x
<i>Serrapinus heterodon</i> Eigenmann, 1915	sardina	yapa	yapa reto	x
<i>Serrapinus piaba</i> (Lütken, 1875)	sardina	yapa	yapa reto	x
<i>Serrapinus sp. 2 (largo)</i>	sardina	yapa	yapa reto	x
<i>Serrapinus sp.1(alto)</i>	sardina	yapa	yapa reto	x
<i>Serrasalmus elongatus</i> Kner, 1858 (*)	piraña	pitifa	pitifa	x x x
<i>Serrasalmus rhombeus</i> (*)	piraña blanca	pitifa	pitifa	maki x x x
<i>Triportheus angulatus</i> (Linnaeus, 1766)	sardina	zipam	yapa	caparoro x x x
<i>Triportheus sp. (alevinos)</i>	sardina	zipam	yapa	caparoro x x x
<i>Tyttocharax tambopatensis</i> Weitzman & Ortega, 1995	mojarra	yapa reto	yapa reto	x
Crenuchidae				
<i>Characidium ethostoma</i> Cope, 1872	lisita	misinochse	seo fero	kipare x
<i>Characidium rex</i>	lisita	misinochse	seo fero	kipare x
<i>Characidium sp.</i>	lisita	misinochse	seo fero	kipare x
<i>Elacocharax sp.</i>	mojarrita	yapa	yapa	x
Curimatidae				
<i>Curimata sp.</i>	lisa	posto fafe	posto fafe	covana x x
<i>Curimatella sp.</i>	chio chio	posto fafe	posto fafe	kisotakiri/ thonto x x
<i>Curimatopsis macrolepis</i> (Steindachner, 1876) (*)	chio chio	posto fafe	posto fafe	kisotakiri/ thonto x x
<i>Cyphocharax spp.</i> (*)	yambina	posto fafe	posto fafe	x
<i>Potamorhina altamazonica</i> (Cope, 1878)	yahuarachi	posto fafe	posto fafe	shimaniroke x x x
<i>Steindachnerina guentheri</i> (Eigenmann & Eigenmann, 1889)	lisa	vohu wui	posto fafe	covana x x
<i>Steindachnerina hypostoma</i> (Boulenger, 1887)	lisa	vaca pashoca	posto fafe	covana x x
<i>Steindachnerina sp.</i>	lisa	posto fafe	posto fafe	covana x x
Cynodontidae				
<i>Hydrolicus sp.</i> (*)	chambira	fooxoma	fooxoma	savirimereki x x
<i>Rhaphiodon vulpinus</i>	chambira	fooxoma	fooxoma	savirimereki x x
Erythrinidae				
<i>Hopliaerithrinus unitaeniatus</i> Agassiz, 1829	shuyo	noshá	noshá	x x
<i>Hoplias malabaricus</i> (Bloch, 1794)	fasaco	mexko	mexko	amakiri x x
Gasteropelecidae				
<i>Carnegiella meyersi</i> Fernández-Yépez, 1950	pechito	tetoko	tetoko	ñarontzi x
<i>Thoracocharax stellatus</i> (Kner, 1858)	mañana me voy	yapa tutunya	tetoko	
Hemiodontidae				
<i>Anodus sp.</i> (*)	yulilla	pese kerex	pese kerex	chachape x x
<i>Hemiodopsis sp.</i> (*)	yulilla	pese kerex	pese kerex	chachape x x
<i>Hemiodus sp.</i> (*)	yulilla	pese kerex	pese kerex	chachape x x
Lebiasinidae				
<i>Pyrrhulina sp.</i>	pez lápiz			x
Parodontidae				
<i>Parodon sp.</i>	lisita	xuvon vuro	seo fero	pairi x
Prochilodontidae				
<i>Prochilodus nigricans</i> Spix & Agassiz, 1829	boquichico	yumba	fofe	shima x x
Clupeiformes				
Engraulidae				
<i>Anchoviella guianensis</i> (Eigenmann, 1912)	anchoveta	yapa reto	yapa reto	x
Gymnotiformes				
Apterontidae				
<i>Sternarcorhynchus oxyrhynchus</i> (Müller & Troschel, 1849)	macana	cunzu	kate	cheviro x
Gymnotidae				
<i>Electrophorus electricus</i> (Linnaeus, 1766) (*)	anguila	coninha	koni	tzinke x
<i>Gymnotus sp.</i>	macana	cunzu	shima	chaviro x
Sternopygidae				

(continúa...)

**Apéndice 1.** continuación

Taxas	Nombre común	Nombres en lengua nativa Ama Yami	Asha	Usos A C O
<i>Eigenmannia sp.</i> (*)	macana	cunzu	kate	cheviro
Myliobatiformes				
Potamotrygonidae				
<i>Potamotrygon motoro</i> (Müller & Henle, 1841)	raya	hy	payo shara	mamao x x
Perciformes				
Cichlidae				
<i>Aequidens tetramerus</i> (Heckel, 1840)	bujurqui	mahin	mae	maento x
<i>Aistogramma sp.</i>	bujurqui	mahin	mae	maento x
<i>Bujurquina apoparahuana</i> Kullander, 1986	bujurqui	mahin	mae	maento x
<i>Bujurquina eurhinus</i> Kullander, 1986	bujurqui	mahin	mae	maento x
<i>Bujurquina sp.</i>	bujurqui	mahin	mae	maento x
<i>Cichlasoma sp.</i>	bujurqui	kucashxaon	xao	maento x x
<i>Crenicichla proteus</i> Cope, 1872	bujurqui	kucashxaon	xao	ashara/ asana x x
<i>Crenicichla semicincta</i> Steindachner, 1892	bujurqui	kucashxaon	xao	ashara/ asana x x
<i>Crenicichla sp.</i>	bujurqui	kucashxaon	xao	ashara/ asana x x
Sciaenidae				
<i>Pachyurus schomburgkii</i> Günther, 1860	corvina de río	tora	koro mina	x x
<i>Plagioscion sp.</i> (*)	corvina	koro mina	koro mina	x x
Pleuronectiformes				
Achiridae				
<i>Hypoclineus mentalis</i> (Günther, 1862)	lenguado/ pangaraya			shava x x x
Siluriformes				
Ageniosidae				
<i>Ageneiosus sp.</i> (*)	bocón	cuwawa/ cuyaparo		mapara x x
Aspreinidae				
<i>Bunocephalus sp.</i>	pez banjo	shuuvoya	ifixonofo	x
Callichthyidae				
<i>Callichthys callichthys</i> (Linnaeus, 1758)	shirui	ifixonofo	faxo	x x
<i>Corydoras sp.</i>	shirui	toxko	faxo	kinoñakiri x
<i>Leptophlosternum altamazonicum</i> Reis, 1997	shirui		faxo	x
Cetopsidae				
<i>Cetopsis sp.</i>	canero		rotoko	tagorentzi x
<i>Pseudocetopsis plumbea</i> Reis, 1997 (*)	canero		rotoko	mo x
Doradidae				
<i>Pseudodoras niger</i> (Valenciennes, 1821)	turushuqui	mocho	taya	kahuara x x x
<i>Pterodoras sp.</i> (*)	piro	kafara	kafara	kisonakiri x x x
Heptapteridae				
<i>Cetopsorhamdia sp.</i>	bagre	ififo	ififo	x
<i>Chasmocranus sp. 1 (blanco)</i>	bagre			x
<i>Chasmocranus sp. 2 (negro)</i>	bagre			x
<i>Heptapterus sp.</i>	cunshi			x
<i>Imparfinis sp.</i>	cunshi			x
<i>Pimelodella gracilis</i> (Valenciennes, 1836)	cunshi	koreo	koreo	x x x
<i>Pimelodella sp.</i>	cunshi	koreo	koreo	x x x
<i>Pimelodina sp.</i>	cunshi	hinshish	hinshish	x x
Loricariidae				
<i>Ancistrus sp.</i>	carachama	ishki	ishki	shinpi x x
<i>Aphanotorulus unicolor</i> (Steindachner, 1908)	carachama	yuxcu	hypo	chellaniki x x
<i>Chaetostoma sp. novo</i>	carachama			x
<i>Crossoloricaria rhami</i> Isbrücker & Nijssen, 1983	shitari		mishpoo choxa	mishpoo choxa x
<i>Farlowella sp. 2</i>	shitari			soesoetzi x
<i>Farlowella sp.1</i>	shitari	musti chaxa	musti chaxa	soesoetzi x
<i>Hypostomus ericius</i> Armbruster, 2003	carachama	hipo	hipo	llenllemoco x
<i>Squaliforma emarginata</i> (Valenciennes, 1840)	carachama	yuxcu	hipo	llenllemoco x
<i>Hypostomus sp. 1</i>	carachama	hipo	hipo	llenllemoco x
<i>Hypostomus sp. 2</i>	carachama	hipo	hipo	llenllemoco x
<i>Hypostomus sp. 3 (tigrecito)</i>	carachama	tinki		x
<i>Limatulichthys griseus</i> (Eigenmann, 1909)	shitari			x
<i>Liposarcus sp.</i>	carachama de río			x x
<i>Loricaria clavipinna</i> Fowler, 1940	carachama		choxa	llosiliki x
<i>Loricaria sp.</i>	carachama		choxa	llosiliki x
<i>Loricarichthys sp.</i>	shitari			cherantzi x
<i>Peckoltia sp.</i>	carachama			samoto x
<i>Rineloricaria lanceolata</i> (Günther, 1868)	shitari	mishpoo-choxa	mishpoo-choxa	llosiliki x
<i>Rineloricaria sp.</i>	shitari			llosiliki x
<i>Squaliforma phrixosoma</i> (Fowler, 1940)	carachama de cocha			x
<i>Sturisoma nigrirostrum</i> Fowler, 1940	carachama			tsapiro x
Pimelodidae				
<i>Brachyplatystoma filamentosum</i> (Lichtenstein, 1819)	saltón	naitzaca	oxo fafi	x
<i>Brachyplatystoma flavicans</i> (Castelnau, 1855) (*)	dorado	jovovain	yora fafi	savaronke x
<i>Calophysus macropterus</i> (Lichtenstein, 1819)	mota	motariruvonpara	kaxo	moki x x
<i>Calophysus sp.</i>	mota	cavin	kaxo	moki x x x
<i>Cheiroceros eques</i> Eigenmann, 1917	cunshi			x x

(continúa...)

**Apéndice 1.** continuación

Taxas	Nombre común	Nombres en lengua nativa Ama	Nombres en lengua nativa Yami	Asha	Usos A C O
<i>Duopalatinus goeldii</i> (Vaillant, 1880)	cunshi	kannanin	kerex koreo	coghiva	x
<i>Goslinea sp.</i> (*)	vaselina				x x x
<i>Hemisorubin platyrhynchos</i> (Valenciennes, 1840) (*)	toa	candane	manitoa	kirana	x x
<i>Hypophthalmus sp.</i> (*)	maparate		maparata		x x
<i>Learius sp.</i> (*)	ashara		haviharica		x x
<i>Megalonemas sp.</i>	kuhuara				x x x
<i>Merodontus tigrinus</i> Britski, 1981 (*)	puma zúngaro	hinowain	ino fafi		x x
<i>Phractocephalus hemiolopterus</i> (Bloch & Schneider, 1801) (*)	torre	xawanvara	toko fafi	savaronke	x x x
<i>Pimelodina flavipinnis</i> Steindachner, 1876 (*)	cunshi	toto moto	toto moto		x x
<i>Pimelodus blochii</i> Valenciennes, 1840	cunshi	tono	koreo		x x x
<i>Pimelodus maculatus</i> Lacepède, 1803	cunshi	totokoreo	totokoreo		x x x
<i>Pimelodus ornatus</i> Kner, 1858	cunshi	tono			x x x
<i>Pimelodus pictus</i> Steindachner, 1876 (*)	cunshi	ishish	ishish		x x x
<i>Pimelodus sp.</i>	cunshi	tono	tono		x x
<i>Pinirampus pirinampu</i> (Spix & Agassiz, 1829) (*)	mota flemosa	shishi fafi	shishi fafi		x x x
<i>Platystomatichthys sturio</i> (Kner, 1858)	cunshi	kexpani	kexpani	coghivatonki	x
<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i> (Linnaeus, 1766) (*)	doncella	vaincuya	fafi kenea		x x
<i>Pseudoplatystoma tigrinum</i> (Valenciennes, 1840) (*)	tigre zúngaro	ino fafi	ino fafi		x x
<i>Sorubim lima</i> (Bloch & Schneider, 1801) (*)	shiripira	shiripira	shiripira		x x
<i>Sorubimichthys planiceps</i> (Spix & Agassiz, 1829) (*)	achacubo	charanva	fitax fafi		x x
<i>Zungaro zungaro</i> (Humboldt, 1821) (*)	zúngaro	fafi	fafi		x x
<b>Pseudopimelodidae</b>					
<i>Pseudopimelodus sp.</i>	cunshi	maco	maco	ponke	x
<b>Trichomycteridae</b>					
<i>Henonemus punctatus</i> (Boulenger, 1887)	canero	tzitzimitza			x
<b>Synbranchiformes</b>					
<b>Synbranchidae</b>					
<i>Vandellia plazaii</i> Castelnau, 1855	canero		karino	tziri	x
<i>Synbranchus marmoratus</i> Bloch, 1795	atinga	neron	nero	ironoya	x

(\*) registro mediante entrevista, fotografías y/o observación personal.